



## DRA VANIA OSORIO

UROLOGÍA PEDIÁTRICA Y CIRUGÍA INFANTIL

CED. PROF. MÉDICO CIRUJANO: 4819344

CED. PROF. EN PEDIATRÍA MÉDICA: 6405476

CED. PROF. EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA: 7930954

## ¿BUSCAS ÚROLOGO O CIRUJANO PEDIATRA INFANTIL?

La Dra. Vania Osorio es una excelente opción para el cuidado y atención de tus hijos o familiares pequeños que requieran ya sea intervención quirúrgica o consultas generales de urología pediátrica, su amplia experiencia en el sector privado la posiciona como una doctora que ofrece el cuidado y seguridad necesarios para un servicio confiable en bebés, niños y jóvenes, su pasión por la atención a pequeños la motiva a ser una doctora que se actualiza continuamente para ofrecer tratamientos a la vanguardia, actualmente cuenta con 2 especialidades una en urología pediátrica y otra en cirugía infantil.

### AGENDA UNA CITA EN:

Hospital Air Villahermosa

Hospital Angeles Villahermosa

### ¿Qué es el testículo no descendido?

Los testículos no descendidos, también conocidos como criptorquidia, es una anomalía genital que se puede presentar a temprana edad y que se produce cuando uno o ambos testículos no descienden a la posición adecuada.

### Información general:

- Es la anomalía genital más común en los niños recién nacidos.
- Afecta a entre el 1 y el 3% de los niños nacidos a término y hasta al 30% de los niños nacidos prematuros.
- La mayoría de los testículos no descendidos descienden por sí solos antes de los 3 meses de edad.
- El síntoma más común es que el testículo no se pueda palpar durante un examen.
- Los testículos no descendidos pueden estar relacionados con problemas como hernia, cáncer testicular e infertilidad.

### ¿Cuál es su causa?

La causa de la criptorquidia no se conoce con certeza, pero algunos factores de riesgo son:

- Antecedentes familiares de criptorquidia u otras alteraciones genitales.
- Nacimiento prematuro o con bajo peso.
- Consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo.
- Exposición a pesticidas o productos químicos durante el embarazo.

Si, el testículo no ha descendido para cuando el bebé tenga 6 meses de edad, el médico puede sugerir tratamiento. La cirugía oportuna puede prevenir el daño a los testículos y evitar la esterilidad.

### ¿Sospechas que tu bebé lo padece?

Es momento de agendar una cita con un profesional.  
¡Te espero en consulta!



### ¿Qué es la litiasis en vías urinarias?

La litiasis renal, o cálculos renales, en niños es una enfermedad, que se caracteriza por la formación de piedras en los riñones. Estas piedras pueden desplazarse a las vías urinarias y vejiga, lo que puede obstruir la orina y causar insuficiencia renal en los niños.

### Información general:

Los síntomas de la litiasis renal en niños pueden variar según el tamaño y la ubicación de los cálculos, pero algunos de los más comunes son:

- Dolor en la espalda, el costado, la ingle o la parte inferior del abdomen
- Sangre en la orina
- Orina turbia o con mal olor
- Dolor al orinar
- Irritabilidad

**Acudir a una valoración con tu médico especialista puede ayudarte a prevenir o realizar una intervención quirúrgica oportuna.**

### ¿Cuál es su causa?

La litiasis renal puede tener causas multifactoriales, como factores genéticos, ambientales, raciales y estructurales.

- Algunos medicamentos
- Alimentación deficiente.
- Diabetes
- Obesidad
- Problemas con la forma de las vías urinarias.
- Trastornos metabólicos (problemas con la forma en la que el cuerpo descompone y usa los alimentos)
- Otras afecciones renales.

### ¿Sospechas que tu hijo lo padece?

**Es momento de agendar una cita con un profesional.  
¡Te espero en consulta!**

### ¿Qué es la fimosis?

La Fimosis es una condición médica que afecta a muchos niños y puede tener un impacto significativo en su salud y bienestar. Se caracteriza por la incapacidad de retraer el prepucio, la piel que cubre el glande del pene, en los varones.

Aunque puede ser una condición normal en los recién nacidos y niños pequeños, la Fimosis persistente o complicada puede requerir evaluación y tratamiento especializado.

### Información general:

Puede considerarse que hay fimosis si, a partir de los tres años, el niño continúa sin poder bajar su prepucio por completo, lo cual, además, le puede producir un dolor de leve a intenso. Otro síntoma es que el prepucio se abulte cuando orina y, en los casos más extremos, que la micción sea difícil o imposible.

La detección temprana y el tratamiento adecuado de la Fimosis son fundamentales para evitar complicaciones a largo plazo. Los padres deben estar atentos a los signos de Fimosis y buscar evaluación médica si se presentan síntomas persistentes o preocupantes.

**Si, la fimosis es severa después de los dos años de edad, el niño debe ser valorado por un cirujano infantil para evaluar la necesidad de una circuncisión.**

### ¿Cuál es su causa?

La Fimosis puede presentar una variedad de síntomas, algunos de los cuales pueden ser preocupantes para los padres y el niño. Los síntomas incluyen:

- Dolor al intentar retraer el prepucio: esto puede ocurrir durante el baño, la limpieza o la erección.
- Dificultad para orinar: en casos severos, el prepucio puede causar obstrucción parcial del flujo de orina.
- Infecciones recurrentes: la acumulación de esmegma, una sustancia blanca y grasosa debajo del prepucio, puede provocar infecciones como la balanitis.

### ¿Sospechas que tu hijo lo padece?

**Es momento de agendar una cita con un profesional.  
¡Te espero en consulta!**

### ¿Qué es la Hidronefrosis?

La hidronefrosis en recién nacidos es un agrandamiento o dilatación de la pelvis renal, el embudo en la parte central del riñón donde se acumula la orina. La hidronefrosis puede ocurrir en uno o en ambos riñones. Esta afección a menudo se diagnostica antes del nacimiento, durante una ecografía prenatal.

### Información general:

La mayoría de los niños con hidronefrosis no presentan síntomas, pero pueden tener un mayor riesgo de infecciones en las vías urinarias.

Los síntomas de una IVU pueden incluir:

- Fiebre
- Ardor al orinar
- Orina turbia
- Necesidad imperiosa o repentina de ir al baño
- Dolor de espalda
- Vómitos

**Los profesionales de atención médica pueden usar pruebas de diagnóstico por la imagen del conducto urinario para diagnosticar y encontrar la causa de la hidronefrosis.**

### ¿Cuál es su causa?

La hidronefrosis puede ser causada por:

- Un bloqueo en los uréteres, como una piedra en el riñón, un uréter angosto o reflujo.
- Una estructura anormal del riñón
- Falta de maduración del tracto urinario.

### ¿Sospechas que tu hijo lo padece?

**Es momento de agendar una cita con un profesional. ¡Te espero en consulta!**

### ¿Qué son las malformaciones genitourinarias?

Las malformaciones genitourinarias en niños son defectos de nacimiento que afectan al aparato genital o las vías urinarias. Pueden ser causadas por factores genéticos, medioambientales o desconocidos.

### Información general:

Algunas de las malformaciones más comunes son:

**Testículos no descendidos:** La anomalía más común en niños asignados al sexo masculino al nacer.

**Reflujo vesicoureteral:** Aproximadamente, entre el 1 y el 3 % de todos los bebés y niños tienen una afección llamada reflujo vesicoureteral (RVU), que significa que parte de su orina fluye en dirección equivocada después de entrar en la vejiga.

**Duplicación ureteral:** Los niños que poseen un ureteroceles también pueden tener una duplicación ureteral. Esto significa que poseen dos uréteres para un riñón que drenan independientemente hacia la vejiga.

**Ureteroceles:** el ureterocel es una dilatación quística de la parte terminal del uréter, que se ubica dentro de la vejiga de la uretra o de ambas.

**Uréter ectópico:** es una afección congénita en la que el uréter no se conecta a la vejiga en el lugar correcto, por lo que la orina drena en otro lugar.

**Agenesia vaginal:** es un trastorno poco frecuente que se produce cuando la vagina no se desarrolla y es posible que el útero se desarrolle de forma parcial o no se desarrolle.

**Himen imperforado:** es una anomalía congénita que se caracteriza por la falta de canalización del tejido conjuntivo del himen, lo que impide la permeabilidad vaginal.

**En algunos casos, los médicos utilizan la cirugía para tratar anomalías genitourinarias.**

**El médico analizará sus opciones y le informará si la cirugía es adecuada para usted.**

**¿Tienes un hijo que padezca alguno de estas enfermedades?**

**Es momento de agendar una cita con un profesional.**

**¡Te espero en consulta!**





**DRA VANIA OSORIO**

UROLOGÍA PEDIÁTRICA Y CIRUGÍA INFANTIL

## ***DATOS DE CONTACTO:***



**9934556454**



**uropedia81@gmail.com**



**Dravaniaosorio.com**

## ***AGENDA UNA CITA EN:***

***Hospital Air Villahermosa***

***Hospital Angeles Villahermosa***

### **Nota:**

Este documento no es una guía de soluciones médicas, el contenido es únicamente informativo de nuestros servicios, para un diagnóstico efectivo y confiable, le recomendamos agendar una cita con el médico especialista.